

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số: 888/SYT-NV

V/v phân bổ thuốc Molnupiravir
cho người F0 không triệu chứng
và có triệu chứng nhẹ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất;
- Giám đốc Bệnh viện Âu Cơ.

Thực hiện Quyết định số 4299/QĐ-BYT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt bổ sung đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng; Công văn số 45K2ĐT-KHCN ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế.

Căn cứ kế hoạch phân công nhiệm vụ điều trị COVID -19 tại các đơn vị và qua xem xét Văn bản số 696/VB-BVAV ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Âu Cơ về việc xin cấp thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19; Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo:

1. Giao Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai tiếp nhận thuốc thí điểm điều trị có kiểm soát COVID-19 Molnupiravir 200mg được phân bổ cho tỉnh Đồng Nai (đợt 4) 200.000 viên và thực hiện phân bổ cho Bệnh viện Âu Cơ để phục công tác điều trị người bệnh COVID-19. Số lượng phân bổ cho các đơn vị theo danh sách sau (lần 1 số lượng 800):

	Tên đơn vị	Thuốc phân bổ
1	Bệnh viện Âu Cơ	800
	Tổng cộng	800

2. Giao Bệnh viện Âu Cơ tuân thủ đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia thẩm định, chấp thuận và được Bộ Y tế phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân tham gia nghiên cứu:

a) Tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm đối tượng nhiễm COVID-19 thể nhẹ, trên 18 tuổi, có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc RT-PCR với SARS-CoV-2 dương tính, không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, có SpO2 $\geq 94\%$, có thể dùng thuốc bằng đường uống...

b) Tiêu chuẩn loại trừ bao gồm người bệnh quá mẫn hoặc chống chỉ định với thuốc hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc, tiền sử mắc virus viêm gan B hoặc C kèm xơ gan, bệnh gan giai đoạn cuối, ung thư biểu mô tế bào gan, tiền sử viêm tụy cấp trong vòng 3 tháng trước khi tham gia nghiên cứu hoặc viêm

tụy mạn, tổn thương thận cấp hoặc suy thận nặng hoặc phải chạy thận nhân tạo hay lọc màng bụng trong quá trình sử dụng thuốc, đang sử dụng thuốc kháng đông, thuốc corticoid liều cao, phụ nữ có thai, đang cho con bú và các tình trạng khác được nhân viên y tế đánh giá là không nên tham gia nghiên cứu...

c) Bệnh nhân nam không hiến tinh trùng, khi quan hệ tình dục phải sử dụng biện pháp tránh thai ít nhất trong 90 ngày với nam và 28 ngày với nữ sau liều thuốc cuối cùng. Ưu tiên các đối tượng có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

d) Bệnh viện Âu Cơ thực hiện giám sát, theo dõi, báo cáo các chỉ số sau:

- Số lượng thuốc đã tiếp nhận (số đợt nhận).
- Số lượng thuốc đã sử dụng
- Số lượng thuốc còn dự trữ thực tế tại các đơn vị.
- Kết quả sử dụng thuốc Molnupiravir:
- + Số bệnh nhân tham gia chương trình.
- + Số bệnh nhân đủ điều kiện dùng thuốc.
- + Số bệnh nhân thực tế uống thuốc (*đính kèm danh sách file Excel*).
- + Số thuốc sử dụng (viên).

Nghiêm cấm việc lạm dụng, sử dụng thuốc sai mục đích.


3. Đề nghị Giám đốc Bệnh viện Âu Cơ triển khai thực hiện, đảm bảo các số liệu chính xác, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, sử dụng thuốc sai mục đích và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh và Bộ Y tế./. *ly*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.

(Vg/NV/2022)

GIÁM ĐỐC



Phan Huy Anh Vũ