

V/v phân bổ thuốc Molnupiravir
cho người F0 không triệu chứng
và có triệu chứng nhẹ.

Kính gửi:

- Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai;
- Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện: Định Quán, Tân Phú.
- Giám đốc các Bệnh viện: Bệnh viện Đồng Nai 2.

(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Thực hiện Quyết định số 4299/QĐ-BYT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt bổ sung đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng; Công văn số 45K2ĐT-KHCN ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế.

Căn cứ kế hoạch, phân công nhiệm vụ điều trị COVID-19 tại các đơn vị, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo:

1. Giao Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai tiếp tục phân bổ Molnupiravir 200mg (ưu tiên hạn dùng) cho các đơn vị để phục công tác điều trị người bệnh COVID-19 trong tỉnh Đồng Nai (lần 2/đợt 5) số lượng 20.000 viên.

STT	Tên đơn vị (Phân bổ lần 2/160000 v)	Thuốc xin phân bổ (viên) so 20000 v ngay 21/3/2022	Ghi chú
	Tổng nhận	20,000	
1	Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai	2,000	
2	TTYT Định Quán	8,000	
3	TTYT Tân Phú	8,000	
4	Bệnh viện Đồng Nai 2	2,000	

Tồn cuối kỳ 00 viên

2. Giao Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị tuân thủ đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia thẩm định, chấp thuận và được Bộ Y tế phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân tham gia nghiên cứu:

a) Tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm đối tượng nhiễm COVID-19 thể nhẹ, trên 18 tuổi, có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc RT-PCR với SARS-CoV-2 dương tính, không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, có SpO₂ $\geq 94\%$, có thể dùng thuốc bằng đường uống...

b) Tiêu chuẩn loại trừ bao gồm người bệnh quá mẫn hoặc chống chỉ định với thuốc hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc, tiền sử mắc virus viêm gan B hoặc C kèm xơ gan, bệnh gan giai đoạn cuối, ung thư biểu mô tế bào gan, tiền sử viêm tụy cấp trong vòng 3 tháng trước khi tham gia nghiên cứu hoặc viêm tụy mạn, tổn thương thận cấp hoặc suy thận nặng hoặc phải chạy thận nhân tạo hay lọc màng bụng trong quá trình sử dụng thuốc, đang sử dụng thuốc kháng đông, thuốc corticoid liều cao, phụ nữ có thai, đang cho con bú và các tình trạng khác được nhân viên y tế đánh giá là không nên tham gia nghiên cứu...

c) Bệnh nhân nam không hiến tinh trùng, khi quan hệ tình dục phải sử dụng biện pháp tránh thai ít nhất trong 90 ngày với nam và 28 ngày với nữ sau liều thuốc cuối cùng. Ưu tiên các đối tượng có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

d) Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện giám sát, theo dõi, báo cáo các chỉ số sau:

- Số lượng thuốc đã tiếp nhận (số đợt nhận).
- Số lượng thuốc đã sử dụng.
- Số lượng thuốc còn dự trữ thực tế tại các đơn vị.
- Kết quả sử dụng thuốc Molnupiravir:
 - + Số bệnh nhân tham gia chương trình.
 - + Số bệnh nhân đủ điều kiện dùng thuốc.
 - + Số bệnh nhân thực tế uống thuốc (*đính kèm danh sách file Excel*).
 - + Số thuốc sử dụng (viên).

Nghiêm cấm việc lạm dụng, sử dụng thuốc sai mục đích.

3. Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo các số liệu chính xác. Đơn vị nào để xảy ra tình trạng lạm dụng, sử dụng thuốc sai mục đích sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh và Bộ Y tế. /
ukh

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
(Vg/NV/2022)

GIÁM ĐỐC



Phan Huy Anh Vũ