









SƠ ĐỒ TÓM TẮT VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG

(Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế)

1. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ

(Có thể chuyển độ, nặng lên rất nhanh)

NHE (ĐỘ I)

- Diphenhydramine: uống hoặc tiêm 1mg/kg
- Methylprednisolone: uống hoặc tiêm 1-2 mg/kg hoặc các thuốc tương tự
- Theo dõi sát mạch, HA, y thức...

NẶNG (ĐỘ II)

2. Xử trí ngay bằng ADRENALIN (ống 1mg/1ml) Duy nhất cứu sống người bệnh

TIÊM BẮP

- Người lớn: 1/2 ống
- Trẻ em: 1/5 - 1/3 ống
- Nhắc lại sau mỗi 5-15 phút cho đến khi hết các dấu hiệu về hô hấp và tiêu hóa, huyết động ổn định
- Thiết lập sẵn đường truyền TM NaCl 0,9%

ĐƯỜNG TĨNH MẠCH

- Sau khi tiêm bắp adrenalin > 2 lần huyết áp không lên, các dấu hiệu hô hấp và tiêu hóa nặng lên
- Nếu chưa có đường truyền tĩnh mạch: Truyền TM adrenalin pha loãng 1/10 (0,1mg - 1ml), tiêm nhắc lại khi cần
- Người lớn: 0,5 - 1ml (50 - 100µg)
- Trẻ em: Không áp dụng đường truyền tĩnh mạch chậm
- Nếu đã có đường truyền tĩnh mạch: Truyền tĩnh mạch adrenalin liều tại bất đầu 0,1 µg/kg/phút, chỉnh liều theo mạch và HA

Bảng tham khảo cách pha loãng Adrenalin với dung dịch NaCl 0,9% và tốc độ truyền tĩnh mạch chậm: 01 ống adrenalin 1mg pha với 250ml NaCl 0,9% (như vậy 1ml dung dịch pha loãng có 4µg adrenalin)

Cân nặng người bệnh (kg)	Liều truyền tĩnh mạch adrenalin khởi đầu (0,1µg/kg/phút)	Tốc độ (giọt/phút) với kim tiêm 1ml=20 giọt
Khoảng 80	2ml	40 giọt
Khoảng 70	1,75ml	35 giọt
Khoảng 60	1,50ml	30 giọt
Khoảng 50	1,25ml	25 giọt
Khoảng 40	1ml	20 giọt
Khoảng 30	0,75ml	15 giọt
Khoảng 20	0,5ml	10 giọt
Khoảng 10	0,25ml	5 giọt



Đường dây nóng 800 111 900 9095



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản và tính mạng của nhân dân, bảo vệ sản xuất và đời sống, mọi người phải phòng cháy và chữa cháy như sau:

- Mức 1:** Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của mỗi công dân
- Mức 2:** Mọi người phải nắm vững các quy định về phòng cháy và chữa cháy, nắm vững kiến thức về an toàn phòng cháy và chữa cháy, nắm vững kỹ thuật an toàn trong xử dụng lửa
- Mức 3:** Phải nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, các nguồn nhiệt, lửa cháy và các chất dễ cháy, nổ, độc hại, phóng xạ. Phải nắm vững các quy định về phòng cháy, chữa cháy
- Mức 4:** Khi xảy ra cháy, phải nắm vững kiến thức, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa
- Mức 5:** Phải nắm vững kiến thức, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa
- Mức 6:** Phải nắm vững kiến thức, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa
- Mức 7:** Phải nắm vững kiến thức, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa
- Mức 8:** Phải nắm vững kiến thức, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa, nắm vững kiến thức về xử dụng lửa

Ngày 20 tháng 1 năm 2017

Thị trấn Phố Mới, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY

1

BẢO ĐỘNG

KHI XÂY CHÁY
BẢO ĐỘNG
GẤP

2

CÚP CẦU
ĐẠO ĐIỆN
NƠI XÂY CHÁY

3

DÙNG BÌNH
CHỮA CHÁY
CẮT VÀ NƯỚC
ĐỂ DẬP TẮT

4

DIỄN THOẠI
SỐ 114
ĐÓI CHỮA CHÁY
CHUYÊN NGHIỆP





**CHẤT THẢI
LÂY NHIỄM**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

DANH MỤC TỦ THUỐC CẤP CỨU

TT	Tên hoạt chất	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng
1	Dung dịch Natri Clorid 0.9%	Chai	01	20/02/2028
2	Dung dịch Glucose 5%	Chai	01	02/07/2026
3	Paracetamol 500mg sủi	Viên	05	08/01/2027
4	Aspirin 81mg	Viên	10	09/11/2027
5	Nifedipin 20mg	Viên	05	15/03/2026
6	Methyldopa 250mg	Viên	10	03/10/2027
7	Calci sủi	Viên	05	28/12/2027

CHỦ CƠ SỞ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Phan Triệu Thao