

Số: 5580 /SYT-NV

Đồng Nai, ngày 14 tháng 7 năm 2021

V/v bảo đảm an toàn tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19

(KHẨN)

Kính gửi:

- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai;
 - Bệnh viện đa khoa Thống Nhất;
 - Bệnh viện đa khoa khu vực: Long Khánh, Định Quán, Long Thành;
 - Bệnh viện Cao su Đồng Nai;
 - Bệnh viện Đồng Nai - 2
 - Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark;
 - Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai;
 - Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn – Đồng Nai;
 - Bệnh viện Âu Cơ;
 - Bệnh viện Tâm Hồng Phước;
 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
- (Sau đây gọi là các đơn vị)*

Sở Y tế nhận được Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/202 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Để xử trí, cấp cứu kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm và đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ sở tổ chức tiêm chủng

Phải chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

a) Xử trí tại chỗ.

- Các cơ sở tổ chức tiêm chủng phải chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng nhân lực (đã được tập huấn về khám sàng lọc trước tiêm chủng các loại vắc xin phòng COVID-19; chẩn đoán và xử trí phản vệ); Chuẩn bị đầy đủ Hộp thuốc cấp cứu phản vệ, trang thiết bị y tế để sẵn sàng xử lý, cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm và các tài liệu chuyên môn (Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; sơ đồ chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ; các hướng dẫn chuyên môn liên quan khác...).

- Cơ sở tổ chức tiêm chủng thực hiện xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo các Hướng dẫn chuyên môn (Hướng dẫn

xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán điều trị giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 02/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3348/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Khi vượt quá năng lực, hoặc người được tiêm có diễn biến nặng, nghiêm trọng, cơ sở tiêm chủng chủ động, khẩn trương thông báo và đề nghị hỗ trợ của Đội cấp cứu lưu động hoặc Bệnh viện thường trực cấp cứu đã được Sở Y tế giao nhiệm vụ.

b) Sàng lọc, phân nhóm đối tượng trước khi tiêm chủng.

Các cơ sở tổ chức tiêm chủng triển khai sàng lọc người dân trước khi tổ chức tiêm chủng để phân nhóm: nhóm đủ điều kiện tiêm chủng ngay, nhóm trì hoãn tiêm chủng và nhóm tiêm chủng tại bệnh viện theo Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế.

c) Theo dõi người sau khi được tiêm chủng.

Các cơ sở tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thực hiện và hướng dẫn người được tiêm theo dõi các dấu hiệu, triệu chứng sau tiêm chủng theo nội dung tại Phụ lục 02 (được gửi đính kèm).

d) Đánh giá công tác chuẩn bị xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

Các cơ sở tổ chức tiêm chủng thực hiện rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị xử trí cấp cứu, sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bằng bảng kiểm an toàn tiêm chủng theo Phụ lục 01 (được gửi đính kèm) ngay trước khi thực hiện buổi tiêm chủng.

2. Thành lập đội cấp cứu lưu động.

Giao các Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Long Thành, Định Quán, Bệnh viện Cao su Đồng Nai, Bệnh viện Đồng Nai – 2, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark, Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai, Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn – Đồng Nai, Bệnh viện Âu Cơ, Bệnh viện Tâm Hồng Phước và các Trung tâm Y tế có giường bệnh thành lập các Đội cấp cứu lưu động (mỗi đơn vị thành lập 02 đội) để hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng vắc xin được triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Mỗi Đội cấp cứu lưu động gồm có ít nhất 01 bác sĩ được tập huấn về cấp cứu hồi sức cơ bản và 01 điều dưỡng; có các trang thiết bị, vật tư, thuốc thiết yếu về cấp cứu theo quy định tại Quyết định số 3385/QĐ-BYT ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu

ngoại viện trên xe ô tô cứu thương (trong đó thay thuốc Methylprednisolone Natri Succinate 40mg bằng thuốc Methylprednisolone 40mg).

Các Đội cấp cứu lưu động chuẩn bị sẵn sàng và hỗ trợ cấp cứu các trường hợp có sự cố bất lợi sau tiêm tại điểm tiêm chủng, bảo đảm tiếp cận tới điểm tiêm trong thời gian dưới 10 phút, khi được yêu cầu hỗ trợ từ các cơ sở tiêm chủng.

Phân công các đơn vị phụ trách địa bàn theo Phụ lục 3 (được gửi đính kèm).

3. Bệnh viện thường trực cấp cứu.

Giao các Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, các Bệnh viện đa khoa khu vực, các Trung tâm y tế có giường bệnh chịu trách nhiệm thường trực cấp cứu cho người có sự cố nặng, nguy kịch sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các các điểm, cụm điểm tiêm chủng trên địa bàn. Lưu ý khi chuyển tuyến, các đơn vị cần chuyển đến các Bệnh viện gần nơi có trường hợp cần cấp cứu nhất.

- Các Bệnh viện thường trực cấp cứu phải chuẩn bị sẵn sàng và hỗ trợ xử trí, cấp cứu các trường hợp có sự cố nặng, nguy kịch sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 thông qua tư vấn từ xa, trực tiếp tại điểm tiêm chủng hoặc tiếp nhận cấp cứu, điều trị khi được yêu cầu hỗ trợ.

- Trường hợp phản ứng nặng, hay các sự cố bất lợi sau tiêm nghiêm trọng khác (giảm tiểu cầu, huyết khối; viêm cơ tim, viêm màng tim...) chuyển ngay đến Bệnh viện đa khoa khu vực hoặc bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Trường hợp vượt quá khả năng điều trị, liên hệ với các Bệnh viện tuyến trung ương để hội chẩn hoặc chuyển tuyến điều trị. Thông tin cần liên hệ: Bệnh viện Chợ Rẫy (điện thoại: 02838554137).

4. Yêu cầu các đơn vị được giao phụ trách là bệnh viện thường trực cấp cứu và Đội cấp cứu lưu động khẩn trương rà soát, lập danh sách, kèm thông tin liên lạc (mẫu gửi đính kèm), gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ) theo địa chỉ Email: tonghopnghiepvu5@gmail.com trước ngày **16/7/2021**.

Nhận được văn bản, yêu cầu Giám đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Ban Giám đốc SYT;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các phòng chức năng SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.



GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ

DANH SÁCH

Cử cán bộ chuyên môn tham gia tại các Bệnh viện phụ trách cấp cứu và Đội cấp cứu lưu động xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Số điện thoại liên hệ

BẢNG KIỂM AN TOÀN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên điểm tiêm chủng

Địa chỉ

STT	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ	Có	Không
1.	Danh sách đối tượng tiêm chủng đã được phân loại đối tượng phù hợp với địa điểm tiêm		
2.	Cán bộ y tế tham gia tiêm chủng được tập huấn về an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc; phát hiện và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng)		
3.	Đội cấp cứu lưu động chịu trách nhiệm hỗ trợ cho điểm tiêm:		
	Có sẵn số điện thoại tại bàn khám, bàn tiêm và bàn theo dõi sau tiêm		
	Kiểm tra điện thoại kết nối		
	Đội cấp cứu lưu động đã sẵn sàng ứng trực		
4.	Danh sách và thông tin liên lạc của tối thiểu 1 Bệnh viện thường trực cấp cứu được phân công hỗ trợ chuyên môn và tiếp nhận cấp cứu, điều trị người có sự cố bất lợi sau tiêm nặng, nguy kịch.		
5.	Phiếu hướng dẫn tự theo dõi tại nhà sau tiêm dành cho người được tiêm chủng		
6.	Hướng dẫn, phác đồ và bộ dụng cụ cấp cứu phản vệ:		
	Có sẵn tại bàn tiêm		
	Có sẵn tại bàn theo dõi sau tiêm chủng		
	Bộ dụng cụ cấp cứu phản vệ bao gồm:		
	- Bơm tiêm gắn sẵn kim, đầy kín kim tiêm bằng nắp có chứa 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml tại bàn tiêm và bàn theo dõi sau tiêm.		
	- Hộp cấp cứu phản vệ bao gồm: bơm tiêm: 10ml: 2 cái, 5ml: 2 cái, 1ml: 2 cái, kim tiêm 14-16G: 2 cái; bông tiệt trùng: 1 gói; dây garo: 2 cái; Adrenalin 1mg/1ml: 5 ống; Methylprednisolon 40mg: 2 lọ; Diphenhydramin 10mg” 5 ống; nước cất 10ml: 03 ống		
	- Dụng cụ cấp cứu: oxy; Bóng AMBU và mặt nạ người lớn và trẻ nhỏ; Bơm xịt salbutamol; Bộ đặt nội khí quản và/hoặc bộ mở khí quản và/hoặc mask thanh quản; Các thuốc chống dị ứng đường uống; Dịch truyền: natriclorid 0,9%./.		

....., ngày tháng năm

Người phụ trách điểm tiêm chủng
(ký và ghi rõ họ tên)

Người đánh giá bảng kiểm
(ký và ghi rõ họ tên)

**PHIẾU HƯỚNG DẪN NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG
TỰ THEO DÕI SAU TIÊM CHỦNG VẮC-XIN COVID-19**

(Thời gian tự theo dõi 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu)

I. KHI THẤY MỘT TRONG CÁC DẤU HIỆU SAU:

- 1) Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi;
- 2) Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da;
- 3) Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó;
- 4) Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật;
- 5) Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất;
- 6) Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy;
- 7) Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái;
- 8) Toàn thân:
 - a. Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường
 - b. Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn.
 - c. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt

HÃY LIÊN HỆ VỚI:

- ĐỘI CẤP CỨU LƯU ĐỘNG.....

- HOẶC ĐẾN THĂNG BỆNH VIỆN.....

II. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- 1) Luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- 2) Không nên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng.
- 3) Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ.
- 4) Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm: Tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.
- 5) Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có:
 - a. Sốt dưới 38,5 độ C: Cởi bớt, nói lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ẩm tại trán, hõ nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.
 - b. Sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.

Phụ lục số 3

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN
Xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

STT	Đơn vị	Địa bàn phụ trách	Ghi chú
1	BV ĐKKV Long Khánh	Thành phố Long Khánh	
2	BV ĐKKV Long Thành	Huyện Long Thành	
3	BV ĐKKV Định Quán	Huyện Định Quán	
4	TTYT Biên Hòa	Thành phố Biên Hòa	Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa phối hợp các bệnh viện để phân công phụ trách các phường trên địa bàn
5	BV ĐHYD Shing mark		
6	BV Đồng Nai 2		
7	BV Quốc Đồng Nai		
8	BV ITO Sài Gòn – ĐN		
9	BV Âu Cơ		
10	BV Tâm Hồng Phước		
11	TTYT Trảng Bom	Huyện Trảng Bom	
12	TTYT Vĩnh Cửu	Huyện Vĩnh Cửu	
13	TTYT huyện Thống Nhất	BV Cao su Đồng Nai	
14	TTYT Tân Phú	Huyện Tân Phú	
15	TTYT Cẩm Mỹ	Huyện Cẩm Mỹ	
16	TTYT Nhơn Trạch	Huyện Nhơn Trạch	
17	TTYT Xuân Lộc	Huyện Xuân Lộc	